

Samenvatting van **rotigotine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Rotigotine werkt hetzelfde als dopamine. Dopamine is een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- bij de ziekte van Parkinson
- bij rusteloze benen ('restless legs').

Bij de ziekte van Parkinson: na enkele dagen tot weken merkt u dat u minder stijf bent en makkelijker kunt bewegen.

Bij rusteloze benen: overleg na 6 weken met uw arts of uw klachten voldoende zijn verbeterd.

Gebruik

Rotigotine is er als pleister.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.



1. Haal de pleister uit het zakje en gebruik hem meteen. Verwijder de beschermfolie.
2. Plak de pleister op een droge, schone en onbehaarde huid. Kies een plek op uw buik, dij, heup, zij, schouder of bovenarm.
3. Druk de pleister 30 seconden stevig aan met de palm van uw hand.
4. Plak elke nieuwe pleister op een andere plek. Wacht 2 weken voordat u dezelfde plek weer gebruikt. Zo kan uw huid goed herstellen.
5. Laat de pleister per ongeluk los? Druk hem dan opnieuw goed vast.
6. Blijft hij niet meer goed plakken? Gebruik dan een nieuwe pleister. Plak de volgende pleister op het gewone tijdstip.
7. Plak na gebruik de pleister dubbel met de kleeflaag naar binnen. Doe de pleister terug in het zakje. Lever hem in bij de apotheek of gooi hem weg bij het klein chemisch afval.

Let op!

- Plak de pleister **niet** op een huid die rood, kapot of geïrriteerd is.
- Zorg dat de plek met de pleister niet te warm wordt. Ga **niet** in een warm bad of sauna. Laat de plek niet in fel zonlicht komen. Te veel warmte zorgt ervoor dat het medicijn te snel wordt afgegeven

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- maagdarmklachten
- huidirritatie op de plaats waar u de pleister plakt
- slaperig zijn
- duizelig zijn
- slaapaanvallen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Let op! U mag de **eerste paar dagen niet autorijden** als u met dit medicijn begint.

Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen. Plotselinge **slaapaanvallen** voelen de meeste mensen niet aankomen. U mag **NIET** autorijden als u daar wel eens last van heeft.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Het kan u nog suffer maken.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Wel is bekend dat dit medicijn ervoor kan zorgen dat de borstvoeding vermindert of zelfs stopt. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

