

Samenvatting van **darifenacine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Darifenacine ontspannt de spieren van de blaas.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij aandrangincontinentie, een vorm van urine-incontinentie. U kunt dan moeilijk uw plas ophouden.

Meestal controleert uw arts na 2 weken of het medicijn goed genoeg werkt.

Gebruik

Darifenacine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet heel door met water. **Niet kauwen.**

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- droge mond
- verstopping
- buikpijn
- misselijk zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Rijd géén auto als u last heeft van slaperig zijn, duizelig zijn, moe zijn en wazig zien.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

