

Samenvatting van **norethisteron**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Norethisteron werkt ongeveer hetzelfde als het vrouwelijk hormoon progesteron. Progesteron is belangrijk voor de vruchtbaarheid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- veel bloedverlies bij de menstruatie
- niet ongesteld worden
- uitstellen van het ongesteld worden (menstruatie)
- endometriose (ziekte waar weefsel dat lijkt op het baarmoederslijmvlies op plekken zit waar het niet hoort).
- problemen met de menstruatiecyclus

Gebruik

Norethisteron is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een heel glas water. U mag de tabletten met of zonder eten slikken.

Vaak moet u dit medicijn **een paar dagen of weken per maand** gebruiken. Wanneer en hoelang dat precies is, hangt af van uw klachten.

Meestal moet u norethisteron een paar maanden gebruiken voordat u weet of het goed werkt.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- klachten van de maag of darmen, zoals misselijk zijn en overgeven
- onregelmatig ongesteld worden. Dit gebeurt vooral in het begin.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Of zijn de bijwerkingen na 3 maanden nog niet over? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Als u stopt, kan uw ongesteldheid de eerste tijd wegblijven. Vooral als u norethisteron meerdere maanden heeft gebruikt.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn komt in de moedermelk. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

