Samenvatting van **atomoxetine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Atomoxetine versterkt de werking van noradrenaline in de hersenen. Het zorgt ervoor dat u meer aandacht en energie heeft.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij ADHD (u bent snel afgeleid, doet drukker en doet dingen zonder erbij na te denken).

U merkt het effect van dit medicijn na ongeveer 2 weken.

Gebruik

Atomoxetine is er als capsules.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de capsules met een half glas water.

Meestal neemt u dit medicijn 1 keer per dag in de ochtend. Soms adviseert de arts om een deel van de dagdosis in de ochtend in te nemen en een deel aan het eind van de middag of begin van de avond. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts het voorschrijft.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- droge mond
- problemen met slapen
- maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijk zijn en overgeven
- verhoogde bloeddruk en snelle hartslag.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of

Waarschuwingen

Let op! Wilt u stoppen met dit medicijn? Overleg dan eerst met uw arts. Soms is het nodig om het medicijn langzaam af te bouwen.

Let op! U kunt hoofdpijn krijgen en moe en duizelig worden. Rijd géén auto als u hier last van heeft.

Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.

Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



29-5-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl