

# Samenvatting van **brotizolam**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Brotizolam werkt rustgevend.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij slapeloosheid.

Binnen 1 uur wordt u slaperig.

Gebruik brotizolam niet te vaak. Gebruik het in elk geval niet langer dan 2 weken achter elkaar.

## Gebruik

Brotizolam is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn vlak voordat u gaat slapen.

Slik de tablet met een half glas water.

Of leg de tablet onder de tong. De tablet zal snel oplossen. U kunt de tablet daarna doorslikken, hier is geen water bij nodig.

Uitleg van de apotheker  
op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

- slaperig zijn
- hoofdpijn
- maagdarmklachten
- geheugenproblemen
- minder goede coördinatie. Hierdoor kunt u sneller vallen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Gebruikt u dit medicijn langer dan 1 maand? Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** U mag **24 uur niet autorijden** nadat u dit medicijn heeft gebruikt. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter **NIET** voor lange tijd gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven.