Samenvatting van **carbetocine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Carbetocine lijkt op het lichaamseigen hormoon oxytocine. Het zorgt ervoor dat de baarmoeder samentrekt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om te veel bloedverlies na een bevalling te voorkomen.

Dit medicijn werkt na 2 minuten. Het effect houdt een paar uur aan.

Gebruik

Carbetocine is er als injectie in de spier en in het bloedvat.

U krijgt dit medicijn zo snel mogelijk na de bevalling als injectie in de spier of het bloedvat. Het wordt toegediend door de arts of verpleegkundige.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maagdarmklachten, zoals misselijk zijn, overgeven en buikpijn
- hoofdpijn
- duizelig zijn
- hartkloppingen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

U mag autorijden als u dit medicijn heeft gekregen.

U krijgt dit medicijn meteen na de bevalling. De arts of verpleegkundige zal dit medicijn **niet toedienen als u nog moet bevallen of tijdens de bevalling**. Dit medicijn wekt namelijk weeën op, waardoor de kans bestaat dat u te vroeg bevalt.

U kunt na de bevalling veilig borstvoeding geven.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



24-4-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl