

# Samenvatting van cinnarizine met chloorcyclizine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Cinnarizine met chloorcyclizine zorgt dat u minder misselijk bent.

Cinnarizine met chloorcyclizine werkt bij reisziekte.

Het werkt na ongeveer een half uur en blijft 6 tot 8 uur lang werken.

## Gebruik

Cinnarizine en chloorcyclizine zijn er als tabletten. In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met wat voedsel. Doe dit een half uur voor u vertrekt. Na 8 uur kunt u het nog een keer nemen. Gebruik het maximaal 3 keer per dag.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf en slaperig zijn
- minder snel reageren. Daardoor kunt u eerder vallen.
- wazig zien
- droge mond

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals suf zijn, slaperig zijn of wazig zien. Gebruikt u cinnarizine met chloorcyclizine **2 dagen of korter?** Dan mag u **24 uur** niet autorijden na iedere inname. Daarna mag u alleen autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen. Gebruikt u cinnarizine met chloorcyclizine **elke dag?** Dan mag u **3 dagen** niet autorijden als u start met dit medicijn of als de dosis omhoog gaat. Rijd daarna alleen als u geen last heeft van bijwerkingen.



**Let op** met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen of voor de baby in uw buik.



U mag dit medicijn korte tijd gebruiken als u borstvoeding geeft.

**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

