Samenvatting van **fluspirileen**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fluspirileen remt wanen (u gelooft of denkt dingen die niet kloppen) en hallucinaties (u ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij psychose (u ziet of hoort dingen die er niet zijn).

Dit medicijn werkt 5 tot 15 dagen lang.

Gebruik

Fluspirileen is er als injectie.

Injectie met fluspirileen

U krijgt dit medicijn als injectie van uw arts of verpleegkundige in uw bilspier. Meestal is dat 1 keer per week.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- problemen met bewegen, zoals het trekken van uw spieren, stijve spieren en moeilijker lopen.
- misselijk zijn
- depressieve gevoelens
- slaperig zijn
- (draai)duizelig zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.

Let op! U mag ten minste de **eerste 2 weken** niet autorijden als u met dit medicijn begint. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen zoals slaperig of duizelig zijn.

Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt, want alcohol kan u nog suffer maken.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.

Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

1-5-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl