Samenvatting van **mecasermine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mecasermine is een groeihormoon.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- groeiachterstand bij kinderen
- een ziekte van het energieverbruik: metabool syndroom (insulineresistentiesyndroom)

Gebruik

Mecasermine is er als injectie.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Uw arts of verpleegkundige legt u uit hoe u moet spuiten.
- Kies elke keer een andere injectieplaats. Dan heeft u minder kans dat de injectieplaats gaat irriteren.
- Geef de injectie kort voor of kort na een maaltijd of tussendoortje. Anders daalt uw bloedsuiker te snel.

Bijwerkingen

Uw kind kan last krijgen van:

- te weinig suiker in het bloed (hypo). Dit merkt u aan honger, hoofdpijn, moe voelen, duizelig zijn, een bleek gezicht, trillen, zweten en flauwvallen. Laat uw kind bij een hypo snel iets eten of drinken met (druiven)suiker.
- hoofdpijn
- maagdarmklachten
- pijn in gewrichten, armen of benen
- irritatie op de plek waar u spuit

Heeft uw kind veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.

Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



18-6-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl