Samenvatting van **paroxetine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Paroxetine zorgt voor een betere stemming en het maakt u minder angstig. Het zorgt er ook voor dat een man minder snel klaarkomt tijdens het vrijen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- angststoornissen. Zoals dwangstoornis, paniekstoornis en sociale angststoornis en angst na traumatische gebeurtenissen (posttraumatische stressstoornis).
- zenuwpijn
- jeuk
- premenstrueel syndroom PMS
- te snel klaarkomen (vroegtijdige zaadlozing)
- opvliegers tijdens de overgang
- jeuk en hoesten in de laatste levensfase (palliatieve zorg)

Meestal merkt u binnen een paar weken dat uw klachten minder worden. Daarna kan het nog een paar weken voordat dit medicijn het beste werkt. Soms kunt u zich de eerste weken juist slechter voelen.

Gebruik

Paroxetine is er als tabletten en als drank.
Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met paroxetine
Slik de tabletten met een half glas water.

Drank met paroxetine
1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker.
3. Drink die hoeveelheid op.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- uw maag en darmen. Deze klachten gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend raakt.
- problemen met seks. Bijvoorbeeld minder zin hebben in vrijen of moeilijker een erectie of orgasme krijgen. Soms kunnen deze klachten blijven als u stopt met het medicijn.
- suf of slaperig zijn. Heeft u hier last van? Slik dit medicijn dan voordat u gaat slapen.
- onrustig zijn of niet kunnen slapen. Heeft u hier last van? Slik dit medicijn dan in de ochtend.
- moeilijker kunnen concentreren

Blijft u last houden van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gaat u zich somberder voelen of krijgt u gedachten aan zelfbeschadiging of zelfdoding? Neem direct contact op met uw arts.

Waarschuwingen

Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.

Let op! Paroxetine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met paroxetine.

Let op! Rijd geen auto zolang u suf en slaperig bent of als u zich niet goed kunt concentreren.

Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer en slaperiger maken.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

20-10-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl