

Samenvatting van **propylthiouracil**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Propylthiouracil zorgt ervoor dat uw schildklier minder snel werkt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- een schildklier die te snel werkt
- een plotselinge, ernstige verergering van een te snel werkende schildklier, waardoor uw lichaam te veel schildklierhormoon aanmaakt (thyreotoxische storm)

Het kan **een paar dagen tot weken** duren voordat u merkt dat het medicijn werkt bij een te snel werkende schildklier. Dat ligt aan hoeveel schildklierhormoon er nog in uw lichaam zit.

Gebruik

Propylthiouracil is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.
Kies vaste tijden waarop u dit medicijn inneemt. Dan vergeet u minder snel een tablet

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- jeuk en huiduitslag
- spier- en gewrichtspijn
- misselijk zijn
- hoofdpijn
- de schildklier in uw hals kan groter worden (struma)
- koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? En gebruikt u **750 mg per dag of minder**? U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Gebruikt u **meer dan 750 mg per dag**? Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. U kunt het best **2 uur wachten** met het geven van borstvoeding nadat u dit medicijn heeft gebruikt. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

