Samenvatting van **acetylsalicylzuur bij pijn of ontsteking**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Acetylsalicylzuur bij **pijn of ontsteking** vermindert pijn. Het remt ontstekingen en verlaagt koorts.

Acetylsalicylzuur werkt bij:
- pijn en koorts
- keelpijn en oorpijn
- gewrichtspijn en spierpijn
- klachten bij ongesteld zijn (menstruatieklachten)
- hoofdpijn en migraine

De pijn wordt na **15 tot 30 minuten** minder

Werkt **3 tot 6 uur** lang..

Roodheid en zwelling worden **binnen 1 week minder**.

Gebruik

Acetylsalicylzuur is er als tabletten, bruistabletten, zetpillen en injecties.

Let op! Dit medicijn is er ook als antistollingsmiddel. Daar zijn andere aanwijzingen en waarschuwingen voor.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tablet met acetylsalicylzuur
Slik de tablet met een half glas water.

Bruistablet met acetylsalicylzuur
- Los de bruistablet op in een glas water.
- Wacht tot het bruisen is gestopt en drink op.
- Spoel het glas daarna met water en drink dat ook op. Als dit medicijn lang in uw slokdarm achterblijft, kan het uw slokdarm beschadigen.

Zetpil met acetylsalicylzuur
Maak de zetpil nat en breng het in uw anus (poepgat).

Injectie met acetylsalicylzuur
U krijgt de injectie van uw arts of verpleegkundige.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van maag- en darmzweren of bloedingen. Heeft u makkelijk last van uw maag of gebruikt u dit medicijn voor een lange tijd? Neem acetylsalicylzuur dan tijdens of na het eten in.

Let op! Bent u ouder dan 70 jaar, heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad, of gebruikt u bloedverdunners? Dan heeft u een maagbeschermer nodig. Informeer hiernaar bij uw arts of apotheker.

Waarschuwingen

Let op! Acetylsalicylzuur en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met acetylsalicylzuur.

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door alcohol heeft u meer kans op maagklachten.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag dit medicijn **NIET** gebruiken bij pijn in de tweede helft van uw zwangerschap (vanaf 20 weken).

Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan slecht zijn voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



16-11-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl