Samenvatting van **morfine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Morfine is een **sterke pijnstiller.**

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- ernstige pijn. Zoals na een operatie, ongeluk of hartaanval. Ook bij koliekpijn en kanker.
- erg benauwd zijn
- pijn bij mensen die niet meer beter worden tijdens hun laatste levensfase

Het werkt binnen 1 tot 2 uur.
Tabletten met vertraagde afgifte werken 12 uur lang.

Gebruik

Morfine is er als tabletten, drank en zetpillen.
Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruik morfine zolang u het nodig heeft en volgens een **vast schema**. U krijgt het schema van uw arts of apotheker.

Tabletten met morfine
Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Gebruikt u de tabletten met vertraagde afgifte? Hier komt morfine langzaam uit vrij. De tabletten **niet fijnmaken of kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Drank met morfine
Meet de drank af. Doe dit met het maatbekertje, de doseerpipet of de druppelflacon.

Zetpillen met morfine
1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- erge verstopping. Gebruik daarom elke dag een laxeermiddel.
- suf, moe en duizelig gevoel
  maagklachten en darmklachten. Zoals misselijk zijn, overgeven, buikpijn en minder eetlust.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Als u morfine lang gebruikt, kunt u verslaafd raken. Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk.

Heeft u morfine lang gebruikt en wilt u stoppen? **Stop niet in één keer**. Anders kunt u last krijgen van klachten. Vraag uw apotheker of arts om advies.

Let op! U mag **niet** altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Dit komt doordat u suf en duizelig kan worden. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker en arts.

Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u extra suf of slaperig maken.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik dit medicijn **niet** vlak voor de bevalling.

Let op! Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Let op! Gaat u met dit medicijn op reis? Misschien heeft u een medicijnverklaring nodig. Overleg met uw apotheker.

1-5-2024

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl