Samenvatting van **perindopril**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Perindopril maakt uw bloeddruk lager. Ook zorgt het ervoor dat uw hart beter pompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:
- bij een hoge bloeddruk
- bij hartfalen
- na een hartaanval

Perindopril maakt uw bloeddruk lager binnen 6 weken.
Bij hartfalen heeft u minder moeite met ademen. Ook worden uw enkels minder dik.

Gebruik

Peridopril is er als tabletten.
Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Het is belangrijk dat u dit medicijn **elke dag** inneemt. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:
- Duizelig worden bij het opstaan. Dat gebeurt vooral in het begin. Slik dit medicijn daarom de **eerste dagen in de avond** als u op bed zit. Dan kunt u liggen als u duizelig wordt.
- Kriebelhoest.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Perindopril en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met perindopril..

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.

U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



4-11-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl