Samenvatting van **poliovaccin**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Poliovaccin beschermt tegen infectie met het poliovirus.

Uw arts schrijft dit vaccin voor om **polio te voorkomen** als u meer kans heeft op een polio infectie.
Bijvoorbeeld als u reist naar een gebied waar polio voorkomt of als u veel in contact komt met personen afkomstig uit deze gebieden. Verder als u door uw beroep kans heeft om in aanraking te komen met het poliovirus.

Nadat u alle vaccinaties heeft gehad bent u waarschijnlijk levenslang beschermd.

Gebruik

Poliovaccin is er als injectie.

U krijgt dit vaccin van de arts of verpleegkundige als injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

Heeft u **langer dan 10 jaar geleden** de laatste DTP-prik gehad? Dan heeft u 1 injectie nodig. Reist u naar een land waar polio vaker voorkomt? Dan moet u t**en minste 3 dagen voor vertre**k de injectie krijgen.

Heeft u als kind **niet alle DKTP-Hib-HepB- en DTP-vaccinaties** gehad? Of bent u helemaal **niet gevaccineerd**? Dan heeft u 3 injecties nodig.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van klachten op de plaats van de injectie, zoals:

- pijn
- rode huid
- zwelling

Deze klachten trekken vanzelf weg.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.

U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



15-1-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl