Samenvatting van **tobramycine in het oog**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tobramycine doodt bacteriën (antibioticum). Het maakt roodheid, pijn en zwelling van het oog minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij ooginfecties met bacteriën.

U merkt binnen 3 dagen dat uw oog minder geïrriteerd is.

Gebruik

Tobramycine in het oog is er als oogdruppels en oogzalf.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u dit medicijn gaat gebruiken. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

Oogdruppels

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een ‘gootje’.
4. Houd het flesje boven het ‘gootje’. Knijp in het flesje.
5. Er valt een druppel in het ‘gootje’.
6. Sluit uw oog en druk het traankanaaltje ten minste 1 minuut lang dicht.
7. Sluit het flesje meteen en was uw handen.

Oogzalf

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Pak de tube alsof u een pen vasthoudt. En ga voor een spiegel staan.
3. Trek met uw vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden. Er ontstaat een ‘gootje’.
4. Buig uw hoofd achterover, maar blijf in de spiegel kijken.
5. Breng de tube boven het gootje.
6. Knijp in de tube en laat een sliert zalf van ongeveer een halve centimeter in het gootje vallen.
7. Buig uw hoofd terug en knipper een paar keer.
8. Schroef het dopje terug op het flesje en was uw handen.

Oogdruppels en oogzalven zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze site.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van branderige ogen en wazig zien. Dit gebeurt direct na het gebruik en verdwijnt snel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.

Gebruikt u andere medicijnen in uw oog? Wacht minstens **3 minuten** tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels.

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Wel moet u na het druppelen de traankanaaltjes ten minste 1 minuut dichtdrukken. Er komt dan veel minder van dit medicijn in het bloed.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



13-12-2024

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl