

Vaccin in het kort voor Beyfortus **tegen het RS-virus**

Waarvoor is deze prik?

Deze prik beschermt baby's tegen het Respiratoir Syncytieel-virus (RS-virus). Het RS-virus is erg besmettelijk. Het virus zit in de neus en keel van mensen die besmet zijn. Zij verspreiden het virus door druppeltjes die ontstaan bij niezen, hoesten en praten. Je kind kan de druppeltjes binnenkrijgen via de neus, ogen of mond. Kinderen worden vaker ziek door het RS-virus dan volwassenen. Vooral jonge baby's zijn kwetsbaar voor ernstige ziekte door het RS-virus.

Het RS-virus kan ervoor zorgen dat je kind verkouden wordt, moet hoesten of koorts krijgt. Soms krijgt je kind ook ergere klachten, zoals benauwd zijn of een piepende ademhaling. Ook kan je kind een longontsteking of een oorontsteking krijgen. Elk jaar moeten volgens het RIVM 1500 tot 3000 kinderen door het RS-virus naar het ziekenhuis.

Deze prik is geen vaccin, hoe zit dat?

In de prik tegen het RS-virus zitten antistoffen tegen het RS-virus. Zo'n prik met antistoffen heet passieve immunisatie. Dat is wat anders dan een vaccinatie. Bij een vaccinatie maakt het lichaam zelf antistoffen aan na een prik. Bij een passieve immunisatie zitten die antistoffen al in de prik. Het lichaam hoeft dan niet zelf de antistoffen aan te maken.

Hoe werkt deze prik?



In de RS-prik zitten antistoffen tegen het RS-virus. Hierdoor krijgt je kind antistoffen tegen het RS-virus in het lichaam. Deze antistoffen werken voor ongeveer 6 maanden. Als je kind in contact komt met het RS-virus, beschermen deze antistoffen je kind.

Daardoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.

Uit onderzoek blijkt dat de werkzaamheid van de prik 77% is. Dit betekent dat van de 100 jonge kinderen die zonder deze prik in het ziekenhuis terecht zouden komen, er na de prik nog maar 23 kinderen in het ziekenhuis terechtkomen.

Wanneer krijgt mijn kind deze prik?



Je kind krijgt deze prik **1 keer**. Het Rijksvaccinatieprogramma adviseert dat je kind de prik krijgt als je kind jonger is dan 1 jaar.



Je kind krijg de prik in het bovenbeen.

Is je kind geboren in oktober, november, december, januari, februari of maart? Dan krijgt je kind de prik binnen 2 weken na de geboorte. Het RS-virus komt namelijk vooral voor in deze maanden.

Is je kind geboren in april, mei, juni, juli, augustus of september? Dan krijgt je kind de prik later dat jaar in september of oktober. Dit is vlak voor de periode dat het RS-virus het meest voorkomt.



Is je kind extra kwetsbaar voor het RS-virus? Overleg met je behandelend arts of je kind een tweede prik moet krijgen.

Je ontvangt informatie over de prik tegen het RS-virus van het RIVM, je verloskundige of je consultatiebureau.

De prik tegen het RS-virus is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om kinderen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De prik tegen het RS-virus is gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind deze prik niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de prik **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind meer dan 38 graden **koorts** voordat het de prik krijgt? Het RIVM adviseert dat je dan een nieuwe afspraak maakt voor de prik.

Heeft je kind een slechtere afweer door een ziekte of medicijnen? Dan mag je kind de prik wel krijgen. Het kan alleen zijn dat de prik bij je kind minder goed werkt. Je kind is dan mogelijk minder goed beschermd tegen het RS-virus.



Heeft je kind problemen met de bloedstolling? Overleg dan met de arts of je kind de prik mag krijgen.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere prikken kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Minder dan 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Huiduitslag.
- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Koorts. Als je kind koorts krijgt na de prik tegen het RS-virus, dan adviseert het RIVM je om contact op te nemen met de huisarts.

Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over de prik tegen het RS-virus voor je kind? Bespreek deze dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl), [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl).

Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).