

Vaccin in het kort voor **Comirnaty coronaprik (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19**

Voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je tegen ernstig ziek worden door het coronavirus (SARS-CoV-2). Het coronavirus blijft veranderen en komt nog steeds voor in Nederland. Daarom is dit vaccin aangepast. Je bescherming tegen het virus neemt langzaam af na je laatste prik of coronabesmetting.

Als je besmet raakt met het coronavirus, kan je last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kan je last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus.

Met deze prik wordt je weerstand tegen het coronavirus sterker.

Hoe werkt dit vaccin?



Door de prik maakt je lichaam antistoffen aan die je beter beschermen tegen het virus. Raak je na de coronaprik besmet met het coronavirus? Dan herkent je lichaam dit virus. **Daardoor word je niet ziek of veel minder ziek.**

Wanneer krijg ik dit vaccin?

Je kan dit vaccin krijgen als je 12 jaar of ouder bent. [De Rijksoverheid](#) bepaalt wie de coronaprik mag halen.

Je krijgt deze prik minimaal 3 maanden na je laatste coronaprik.



Je krijgt de prik in je bovenarm.

Let op!



Je mag autorijden als je dit vaccin hebt gehad. Rijd geen auto als je last hebt van bijwerkingen zoals moe zijn.



Ben je zwanger? Je kan je gewoon laten vaccineren.

Belangrijkste waarschuwingen

Vraag aan je arts of je dit vaccin mag krijgen als je:

- Eerder een **allergische reactie** hebt gehad op een vaccin.

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als je:

- **Ernstig ziek** bent of **hoge koorts** hebt voordat je de prik krijgt.

Je hebt een kleine kans op een ontsteking van je hartspier of je hartzakje. Als dit gebeurt, is dat meestal binnen 2 weken. **Neem daarom direct contact op met je arts** als je na de vaccinatie last krijgt van:

- Pijn op de borst.
- Niet goed kunnen ademen.
- Hartkloppingen.

Belangrijkste bijwerkingen

De meeste bijwerkingen krijg je omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus.

Meer dan 1 op de 10 gebruikers van dit vaccin kan last krijgen van de volgende bijwerkingen:

- Pijn of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Moe zijn.
- Koude rillingen.
- Koorts.
- Spierpijn.
- Pijn in de gewrichten.
- Diarree.
- Hoofdpijn.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.

Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over vaccineren? Overleg dan met je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Ga voor meer informatie over de coronaprik naar [rivm.nl/coronaprik](https://www.rivm.nl/coronaprik). Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).