

Vaccin in het kort voor het **DKT-vaccin (22 wekenprik)** voor zwangere vrouwen

Waarvoor is dit vaccin?

Als je zwanger bent, kan je de 22 wekenprik krijgen. Dit vaccin zorgt ervoor dat je baby vanaf de geboorte beschermd is tegen **kinkhoest**. Je bent na deze vaccinatie zelf ook een tijdje beschermd tegen kinkhoest.

Kinkhoest is een ziekte met ontstekingen van de neus, keel en longen. Klachten zijn onder andere veel hoesten en moeite hebben met ademen.

Dit vaccin geeft je ook bescherming tegen bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken.

- **Difterie.** Een ziekte met ernstige ontstekingen van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Een ziekte die kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.

Difterie, kinkhoest en tetanus zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent je lichaam de bacterie die kinkhoest veroorzaakt. Je lichaam maakt antistoffen aan die deze bacterie dood kunnen maken. Deze antistoffen komen via je navelstreng bij je baby.

Komt je baby na de geboorte in contact met de bacterie die kinkhoest veroorzaakt? Dan kunnen de antistoffen die je aan je baby hebt gegeven de bacterie snel doodmaken.

Hierdoor wordt je baby niet ziek of veel minder ziek.

Na de vaccinatie herkent je lichaam ook de bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken.

Wanneer krijg ik dit vaccin?



Je krijgt dit vaccin **1 keer** per zwangerschap.

Je kunt het vaccin vanaf 22 weken zwangerschap tot aan het eind van je zwangerschap krijgen. Het RIVM adviseert dat je de prik zo vroeg mogelijk haalt. De kans is dan groter dat je baby goed beschermd is tegen kinkhoest.

Als je weer zwanger wordt, heb je een nieuwe 22 wekenprik nodig.



Je krijgt de prik in je bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als ik de vaccinatie niet heb gehad?



Heb je de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. Het is belangrijk dat je dit vaccin krijgt. Zo is je baby vanaf de geboorte goed beschermd.

Let op!



Je mag autorijden als je dit vaccin hebt gehad. Rijd geen auto als je last hebt van bijwerkingen zoals moe zijn of als je je ziek voelt.



Ben je zwanger? Je kan je gewoon laten vaccineren.

Belangrijkste waarschuwingen



Heb je **koorts** voordat je de vaccinatie krijgt? Je kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je meer dan 38,5 graden koorts hebt.

Vraag aan je arts of je

dit vaccin mag krijgen als je:

- Eerder een **allergische reactie** hebt gehad op een vaccin.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat je afweer gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen kinkhoest van jezelf en je kind.

Ongeveer 1 op de 10 personen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Moe zijn.
- Een ziek gevoel.
- Hoofdpijn.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren? Bespreek deze dan met de jeugdarts of met je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Of kijk voor meer informatie op apotheek.nl, thuisarts.nl of rijksvaccinatieprogramma.nl.

Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.