

# Vaccin in het kort voor het **Meningokokken ACWY-vaccin (MenQuadfi)**

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je kind tegen **4 verschillende soorten meningokokken**. De soorten A, C, W en Y.

Meningokokken zijn bacteriën die kunnen zorgen voor een ontsteking. Zoals een ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking) of bloedvergiftiging. De ontsteking kan ook klachten geven die niet meer over gaan. Zoals aanvallen van epilepsie, doof zijn, minder goed kunnen concentreren en problemen met de ogen.

Een ontsteking met meningokokken is ernstig en kan dodelijk zijn.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van je kind de 4 soorten meningokokken. Komt je kind na de vaccinatie in contact met deze bacteriën? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die deze bacteriën dood maken. **Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

## Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Je kind krijgt het meningokokkenvaccin **2 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit op de leeftijd van 14 maanden en in het jaar dat je kind 14 jaar wordt.

Je kind krijgt het meningokokkenvaccin MenQuadfi als je kind 14 maanden oud is.

Het kan zijn dat je kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van je kind.



Je kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind een **lichte ontsteking**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Het is belangrijk dat je kind de vaccinaties tegen meningokokken krijgt. Dit is vooral belangrijk voor kinderen tussen 1 en 4 jaar en jongeren vanaf 14 jaar. Zij lopen namelijk extra risico op een besmetting met meningokokken.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen meningokokken.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen van 12 tot 23 maanden oud krijgt last van:

- Pijn, rood, dikker of gevoelig worden van de huid op de plek van de prik.
- Prikkelbaar zijn.
- Huilen.
- Minder zin hebben in eten.
- Slaperig zijn.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen van 12 tot 23 maanden oud krijgt last van:

- Koorts, overgeven of diarree.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren van je kind? Overleg dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).