

Vaccin in het kort voor het **Pneumokokkenvaccin**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je kind tegen **15 verschillende soorten pneumokokken**. Dit zijn bacteriën die kunnen zorgen voor een ontsteking. Zoals een ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking), een longontsteking, bloedvergiftiging of een ontsteking van het middenoor.

Deze ziektes zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam de 15 pneumokokken bacteriën.

Komt je kind na de vaccinatie in contact met deze bacteriën? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die deze bacteriën dood maken. **Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Je kind krijgt deze vaccinatie **3 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit wanneer je kind 3 maanden, 5 maanden en 12 maanden oud is. Je kind krijgt op hetzelfde moment ook de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en eventueel de rotavirusvaccinatie.

Het kan zijn dat je kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van je kind.



Je kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind een **lichte ontsteking**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Het is belangrijk dat je kind alle 3 de vaccinaties krijgt. Anders is je kind niet voldoende beschermd. Je kind kan dan toch nog ziek worden. Dit is vooral belangrijk voor kinderen jonger dan 5 jaar. Deze kinderen lopen namelijk extra risico op een besmetting met pneumokokken.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen pneumokokken.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen tot 2 jaar oud kan last krijgen van:

- Koorts.
- Gevoelig zijn en snel boos worden.
- Suf zijn.
- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Minder zin hebben in eten.
- Harde plek op de plek van de prik.
- Slaperig zijn.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren van je kind? Overleg dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).