

Samenvatting van **acetylcysteïne**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Acetylcysteïne verdunt taai slijm in de longen. U kunt het daardoor makkelijker ophoesten.

Acetylcysteïne werkt bij:

- Slijmhoest. Zoals bij de longziekte astma.
- 'Complex regionaal pijnsyndroom'. Dat is blijvende pijn, veranderende huid en een warme of koude huid na een ernstige verwonding.

Bij slijmhoest wordt het slijm na ongeveer 2 uur losser.

Gebruik

Acetylcysteïne is er als tabletten, zuigtabletten, bruistabletten, poeder, granulaat (korrels) en drank.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met acetylcysteïne

Slik de tabletten met een half glas water.

Zuigtabletten met acetylcysteïne

Laat de tablet in uw mond smelten en slik daarna door.

Bruistabletten en poeder met acetylcysteïne

1. Doe de bruistabletten of het poeder in een glas water.
2. Roer goed en drink het op.
Let op! Los dit medicijn niet op in melk of een andere drank. Want dan werkt het minder goed.

Granulaat in zakjes met acetylcysteïne

1. Doe de korrels in een half glas water.
2. Roer goed en drink het op.

Drank met acetylcysteïne

1. Schud de drank goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af in het maatbekertje en drink op.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van maagdarmklachten. Zoals misselijk zijn en buikpijn.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

