

Samenvatting van **allopurinol**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Allopurinol zorgt voor minder urinezuur in uw bloed. Door te veel urinezuur ontstaan kristallen in gewrichten (jicht) en nieren (nierstenen). Ook kunnen er knobbels onder de huid ontstaan.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- jicht
- nierstenen
- nierziekten
- kanker
- stofwisselingsziekten

Allopurinol werkt niet meteen. Dit duurt een paar weken tot maanden.

Gebruik

Allopurinol is er als tabletten. Dit medicijn wordt soms ook als infuus of injectie gegeven. Deze tekst gaat alleen over de tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met allopurinol

- Slik de tablet met een half glas water.
- Neem de tabletten tijdens of vlak na het eten in. Dan heeft u minder kans op maagklachten.
- Neem de tablet elke dag in op hetzelfde tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

Drink veel tijdens de behandeling (2 tot 3 liter vocht per dag).

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- juist extra jichtaanvallen in de eerste weken. Daarom schrijven artsen soms een medicijn voor tegen gewrichtsontstekingen voordat u aan allopurinol begint.
- misselijk voelen en overgeven
- huiduitslag en overgevoeligheid. Waarschuw direct een arts bij benauwd zijn, blaren op de huid en slijmvliezen of zwelling in het gezicht.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

