

Samenvatting van azijnzuur en triamcinolonacetonide in het oor

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Azijnzuur is een zure stof en werkt ontsmettend. Triamcinolonacetonide is een bijnierschorsormoon en remt ontstekingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij ontsteking van de gehoorgang.

Gebruik

Azijnzuur en triamcinolonacetonide in het oor is er als oordruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Bij gebruik met gaasje of oortampon:

(uw arts heeft een opgerold gaasje of oortampon natgemaakt met de oordruppeloplossing en in uw oor gedaan)

1. Houd het gaasje of de oortampon vochtig door regelmatig (ongeveer 6 tot 8 keer per dag) met de oordruppels te druppelen.
2. De arts adviseert u meestal het gaasje of de oortampon na 24 uur te verwisselen.

Bij gebruik zonder gaasje of oortampon:

1. Maak het druppelflesje even warm in uw handen.
2. Houd uw hoofd opzij.
3. Trek het oor naar boven en naar achteren.
4. Laat de druppels in de gehoorgang van uw oor vallen.
5. Houd uw hoofd nog 3 minuten schuin of ga op uw zij liggen.

Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag. Dan werkt dit medicijn het beste.

Gebruik deze oordruppels zo lang u klachten heeft. Meestal is 1 tot 2 weken voldoende.

Bijwerkingen

U kunt meteen na het druppelen last krijgen van een pijnlijk of brandend gevoel in uw oor. Dit verdwijnt snel. Houdt u hier toch last van? Neem dan contact op met uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Heeft u een gaatje of buisje in uw trommelvlies? Overleg dan met uw arts. Er bestaat een risico dat u last krijgt van doofheid. Maar doofheid kan ook ontstaan als de oorontsteking niet goed wordt behandeld. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Heeft u samen met uw arts besloten dat u dit medicijn gaat gebruiken? En krijgt u last van oorsuizen en doofheid? Neem dan contact op met uw arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

