

# Samenvatting van **budesonide om in te nemen**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Budesonide is een corticosteroid. Dat is een hormoon uit de bijnierschors.

Het remt ontstekingen.

Budesonide zorgt voor **minder ontstekingen in de darm**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- ontstekingen aan de darmen die niet overgaan, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
- ontsteking van de lever
- ontsteking van de slokdarm
- het erger worden van darmontstekingen. Hierbij ontstaan er in korte tijd veel ontstekingen in de darmen. Uw darmen doen het dan niet meer goed.

Bij ontstekingen in de darmen werkt budesonide binnen een paar uur.

U gebruikt budesonide tot de ziekte weer tot rust is gekomen. Dat is meestal 4 tot 8 weken.

## Gebruik

Budesonide is er als capsules, gewone tabletten, korrels, en smelttabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Capsules en tabletten met budesonide

Slik de capsule of tablet met een half glas water.

**Let op!** U mag niet kauwen op de tablet of de capsule. U mag de capsules openen. Slik de inhoud van de capsule zonder te kauwen.

### Korrels met budesonide

Leg de korrels op uw tong en slik ze heel door met een half glas water. Kauw niet op de korrels.

### Smelttabletten met budesonide

Laat de tablet op uw tong smelten. Slik het daarna door. U mag dan een **half uur niet eten, drinken of tanden poetsen**.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten aan uw maag of darmen. Zoals misselijk zijn en opkomend maagzuur.
- hoofdpijn
- spierpijn
- veranderingen in emoties
- vocht vasthouden in uw benen of handen
- meer kans op infecties

Gebruikt u budesonide vaker in een jaar? Of langer dan een paar weken? U kunt dan last krijgen van:

- zwaarder worden
- een bol gezicht
- huidklachten, zoals blauwe plekken
- broze botten

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Let op! Gebruikt u dit medicijn langer dan 3 weken en gaat u stoppen? Stop dan niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** Budesonide en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met budesonide.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

