

Samenvatting van clonidine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clonidine maakt uw bloedvaten wijder. Het dempt in de hersenen ook de effecten van sommige stoffen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor (bij):

- opvliegers tijdens de overgang
- hoge bloeddruk
- ontwenningklachten bij afkicken van een verslaving

Binnen 4 weken zijn de opvliegers minder hevig en komen ze minder vaak voor. Als u stopt met dit medicijn moet het in een paar dagen worden afgebouwd. Uw bloeddruk daalt langzaam binnen een paar weken. Bij ontwenningverschijnselen gebruikt u clonidine een paar dagen tot een week. Het moet daarna in 2 tot 3 dagen worden afgebouwd.

Gebruik

Clonidine is er als tabletten en injectie. De injectie wordt gebruikt in het ziekenhuis.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met clonidine

- Slik de tablet met een half glas water.
- U gebruikt het medicijn 1 tot 4 keer per dag. Verdeel de doses over de dag. Dan werkt het de hele tijd.

Injectie met clonidine

U krijgt de injectie in het ziekenhuis van uw arts of verpleegkundige.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig en duizelig worden
- droge mond
- hoofdpijn
- misselijk voelen
- psychische klachten, zoals depressief voelen

De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan clonidine. Houdt u klachten? Of heeft u veel last van deze bijwerkingen?

Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Rijd de eerste 3 dagen geen auto. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. **Pas nadat u 3 dagen dezelfde dosering heeft gebruikt**, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. <et is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan slecht zijn voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

