

Samenvatting van diltiazem

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Diltiazem maakt uw bloedvaten wijder en verlaagt uw bloeddruk. Het zorgt ervoor dat uw hart meer zuurstof krijgt en dat uw hart regelmatig gaat kloppen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst)
- hartritmestoornissen
- hoge bloeddruk

Bij een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst heeft u binnen 15 minuten (gewone tabletten) tot 2 uur (tabletten met vertraagde afgifte) minder last van pijn.

Gebruik

Diltiazem is er als gewone tabletten, tabletten met gereguleerde afgifte (retard of MGA) en capsules met gereguleerde afgifte (retard of MGA).

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gewone tabletten

Slik de tabletten met een half glas water.

Tabletten met gereguleerde afgifte (retard of MGA)

Let op! Hier komt diltiazem langzaam uit vrij. U mag deze tabletten niet fijnmaken of kauwen. Anders komt dit medicijn in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Heeft de tablet een breukstreep? Dan mag u de tablet op de breukstreep doormidden breken. De beide helften moet u heel doorslikken met een beetje water.

Capsules met gereguleerde afgifte (retard of MGA)

Let op! Hier komt diltiazem langzaam uit vrij. U mag deze capsules niet kauwen. Anders komt dit medicijn in één keer vrij. Slik de capsule héél door.

Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u de capsule openen. Neem de korreltjes dan wel in zonder te kauwen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- dikke enkels en onderbenen
- duizelig voelen
- hoofdpijn
- opvliegers
- blozen
- maagdarmlachten, zoals misselijkheid, buikpijn en verstopping

De meeste bijwerkingen gaan binnen een paar weken vanzelf over. Blijft u veel last houden van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Let op! Eet of drink niet te veel grapefruit(sap). U kunt meer last krijgen van bijwerkingen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

