

Samenvatting van fentanyl

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fentanyl is een **sterke pijnstiller**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij **hevige pijn**, zoals:

- na operaties
- bij verwondingen
- door kanker
- na een hartaanval
- bij mensen die niet meer beter worden tijdens hun laatste levensfase

Tabletten voor in de mondholte, neusspray en zuigtabletten ('lolly') werken snel.

Ze maken binnen 10 tot 30 minuten de pijn minder en blijven 1 tot 4 uur lang werken.

De snel werkende vormen van dit medicijn gebruikt u bij pijn die plotseling opvlamt (doorbraakpijn).

Heeft u vaker dan **4 keer per dag doorbraakpijn**?

Waarschuw dan uw arts.

De pleisters werken traag. Ze maken binnen 1 dag de pijn minder en blijven 2 tot 3 dagen lang werken.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Erge verstopping in uw darmen.
Gebruik daarom elke dag een laxeermiddel.
- Andere klachten aan uw maag of darmen.
- Suf en duizelig zijn.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Fentanyl is er als pleister, tabletten voor onder de tong, tabletten om in de mond te houden, zuigtabletten ('lolly'), neusspray en injecties.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Pleister met fentanyl

1. Plak de pleister op een schone en droge plaats op uw **bovenlichaam** of in de **bovenarm**.
2. Druk de pleister goed aan.
3. **Let op!** Plak de pleister **elke 3 dagen op een andere plaats**. Anders kan de pleister uw huid irriteren.
4. Gebruik de pleisters zolang u ze nodig heeft en volgens een vast schema.

Tabletten met fentanyl voor onder uw tong

1. Plaats de tablet onder uw tong en wacht tot de tablet helemaal is oplost.
2. **Let op!** Niet zuigen of bijten op de tablet. Slik het ook niet door.

Tabletten met fentanyl om in uw mond te houden (Effentora)

1. Houd de tablet tussen uw wang en uw tandvlees vlakbij een van uw achterste kiezen.
2. **Let op!** Niet zuigen of bijten op de tablet. Slik het ook niet door.

Zuigtabletten ('lolly') met fentanyl (Actiq)

1. Houd de lolly 15 minuten in uw mond tegen uw wang aan.
2. Draai de lolly regelmatig.
3. **Let op!** Niet kauwen of bijten op de lolly.

Neusspray met fentanyl

1. Snuit vooraf uw neus.
2. Zit of sta rechtop en houd uw hoofd een beetje voorover.
3. de tuit in één neusgat, houd het andere neusgat dicht.
4. Druk het pompje 1 keer in, terwijl u door de neus inademt.

Injecties met fentanyl

Injecties worden door uw arts of verpleegkundige gegeven.

Let op! Gebruik snel werkende vormen van dit medicijn niet door elkaar. Hierdoor is het onvoorspelbaar hoe dit medicijn werkt.

Samenvatting van fentanyl

Waarschuwingen



Let op! Heeft u dit medicijn lang gebruikt en wilt u stoppen? **Stop niet in één keer.** Anders kunt u last krijgen van ontwenningssverschijnselen, zoals onrust, overgeven, zweten en slecht slapen. Vraag uw apotheker of arts om advies.



Let op! U mag **niet** altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Dit komt doordat u suf en duizelig kan zijn. Hoelang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker en arts.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u extra suf of slaperig maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan een klein beetje in de moedermelk komen. Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. Bijvoorbeeld een paar dagen.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

