

# Samenvatting van gabapentine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Gabapentine brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- zenuwpijn
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS of posttraumatische dystrofie)
- hik die niet over gaat
- spierkrampen
- rusteloze benen
- opvliegers na de behandeling van borstkanker
- pijn na een operatie

Het kan een paar weken duren voordat u merkt dat dit medicijn werkt.

## Gebruik

Gabapentine is er als tabletten, capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten en capsules met gabapentine

Slik de tabletten en capsules heel door met een half glas water.

### Drank met gabapentine

1. Meet de juiste hoeveelheid af met een doseerspuit.
2. Druk de spuit leeg in uw mond en slik de drank door.
3. Spoel de spuit na met wat water.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf of duizelig zijn
  - niet kunnen slapen
  - problemen met bewegen, zoals onzeker lopen.
- Deze bijwerkingen zijn in het begin vaak het sterkst, maar verdwijnen binnen een paar weken vanzelf.

Verder kunt u meer kans hebben op infecties, zoals verkoudheid.

U heeft **minder kans op bijwerkingen** als u met een **lage hoeveelheid** begint en de dosering daarna langzaam opbouwt. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** U mag de eerste week niet autorijden. Nadat u 1 week dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Rijd alleen als u geen bijwerkingen heeft.



**Let op met alcohol** als u dit medicijn gebruikt. Alcohol maakt u nog suffer.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.