

# Samenvatting van haloperidol

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Haloperidol is een medicijn tegen psychose. Het zorgt er ook voor dat tics minder worden.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- psychose bij schizofrenie
- onrust (zoals bij dementie)
- dwangstoornissen
- tics (bewegingen of geluiden die u tegen uw zin in maakt)
- manie (u heeft dan te veel energie, weinig slaap nodig en bent veel blij)

De drank en tabletten werken binnen een paar uur.

Het blijft ongeveer een halve dag werken.

Er zijn snelwerkende injecties die een halve dag werken. En langzaam werkende injecties die ongeveer 4 weken lang werken.

U moet dit medicijn een half jaar tot meerdere jaren gebruiken.

## Gebruik

Haloperidol is er als tabletten, drank en injecties.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met haloperidol

Slik de tabletten met een half glas water.

### Drank met haloperidol

Druppel de drank in een half glas water en drink het op. U kunt de drank ook innemen zonder water.

Druppel de drank dan op een lepel en neem het in.

### Injecties met haloperidol

U krijgt de injectie van uw arts of verpleegkundige.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- seksuele problemen, zoals minder zin in vrijen
- een leeg gevoel
- hoofdpijn
- depressie
- klachten van uw maag en darmen
- aankomen of afvallen
- kwijlen, vooral als u slaapt
- problemen met bewegen, zoals het trekken van uw spieren, stijve spieren en niet stil kunnen zitten

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Heeft u haloperidol al een paar weken gebruikt? Stop dan niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** U mag **niet autorijden als u begint met dit medicijn en als uw dosering omhoog gaat.** Dit komt doordat u suf, slaperig en in de war kan zijn. Hoelang u niet mag autorijden hangt af van hoe en hoelang u dit medicijn gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker of arts.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. **Let wel op!** Merkt u dat uw baby suf wordt en minder goed drinkt? Neem dan contact op met uw arts.