

# Samenvatting van lidocaïne op de huid

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lidocaïne verdooft uw huid.  
Het werkt na een paar minuten.

U gebruikt dit medicijn bij:

- pijn en jeuk.  
Bijvoorbeeld bij een wondje of insecten-beten.
- pijn of een branderig gevoel door aambeien of scheurtjes bij uw anus (poepgat)
- zenuwpijn

## Gebruik

Lidocaïne op de huid is er als zalf, crème, gel of pleister.  
Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Zalf, crème of gel met lidocaïne

Smeer de zalf, crème of gel op de plekken met pijn of jeuk. Gebruik daarvoor een vingercondoom. Vraag dit bij uw apotheek.

Zorg dat het medicijn niet op andere plekken komt.  
Komt het in uw **ogen**? Spoel dan goed met water en overleg met uw arts.

### Pleisters met lidocaïne

Een pleister mag niet langer dan 12 uur op de huid zitten. Wacht daarna 12 uur voordat u een nieuwe pleister plakt op dezelfde plek.

**Let op!** U mag niet meer dan 3 pleisters plakken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- een rode huid
- jeuk
- een brandend gevoel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden terwijl u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

**Let op!** Smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Smeer het dan direct ná de borstvoeding op of rond uw tepel. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

