

# Samenvatting van **mebeverine**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mebeverine werkt tegen darmkrampen. Uw arts schrijft dit medicijn voor bij het prikkelbaredarmsyndroom (darmkrampen).

Mebeverine werkt binnen een paar uur.

## Gebruik

Mebeverine is er als capsules

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de capsule heel door met een half glas water. Niet kauwen.

Heeft u moeite met slikken? U mag de capsule ook open maken en de korrels doorslikken. Kauw niet op de korrels.

U gebruikt de capsules 2 keer op een dag, 's ochtends en 's avonds.

Wordt uw stoelgang plotseling anders? Verliest u bloed of slijm bij de ontlasting? Of valt u ineens veel af? Waarschuw dan direct uw arts.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Overgevoeligheid. U kan dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen.
- Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

