

Samenvatting van medroxyprogesteron-prikpil

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Medroxyprogesteron-prikpil is een anticonceptiemiddel.

Het bevat het vrouwelijk geslachtshormoon medroxyprogesteron. Dit heeft ongeveer een zelfde werking als het natuurlijke progesteron. Progesteron is belangrijk voor de vruchtbaarheid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om zwangerschap te voorkomen.

Gebruik

Medroxyprogesteron is er als injecties en tabletten. Deze tekst gaat alleen over de injectie met als toepassing 'prikpil'.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken. U krijgt de injectie van uw arts of verpleegkundige. Soms kunt u ook zelf spuiten. Uw arts of verpleegkundige legt u uit hoe u moet spuiten.

Na de eerste injectie bent u meteen of na 2 weken beschermd tegen zwangerschap. Dat hangt af van het moment waarop u de eerste injectie krijgt. De prikpil werkt minimaal 3 maanden.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- onregelmatig bloedverlies ('spotting'), vooral tijdens de eerste 3 tot 6 maanden
- wegblijven van de menstruatie
Na het stoppen kan het paar maanden duren voordat u weer menstrueert. Soms duurt het 2 jaar voor u zwanger kunt worden.
- stemmingsveranderingen
- dikke enkels en voeten
- hoofdpijn
- misselijk zijn
- puistjes
- pijnlijke borsten
- minder zin in vrijen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Of heeft u na 3 maanden nog steeds last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Dit medicijn is bedoeld om een zwangerschap te voorkomen. Bent u ondanks de prikpil toch zwanger geworden? Overleg dan met uw arts.



Wilt u borstvoeding geven? U kunt pas 6 weken nadat u bent gestopt met de prikpil veilig borstvoeding geven. Wilt u toch eerder beginnen? Overleg dan met uw apotheker of arts.