

# Samenvatting van mesalazine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mesalazine remt ontstekingen in de darmwand.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de chronische darmontsteking colitis ulcerosa.

## Gebruik

Mesalazine is er als tabletten, granulaat (korrels), zetpillen, klysma en schuim voor in de anus (poepgat).

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten of korrels met mesalazine

Slik de tabletten of korrels door met een half glas water, zonder te kauwen.

Sommige korrels kunt u ook op wat eten strooien, zoals yoghurt. Sommige tabletten mag u uiteen laten vallen. Vraag dit aan uw apotheek.

### Zetpillen en klysma met mesalazine

Dit medicijn werkt het beste als u het gebruikt voor u gaat slapen. Moet u het vaker per dag gebruiken? Gebruik de zetpillen en klysma's dan verdeeld over de dag, nadat u heeft gepoept.

Bekijk de **video met uitleg** op Apotheek.nl. Scan de QR-code hiernaast om het filmpje te zien voor het klysma en zetpil.



### Schuim met mesalazine

Dit medicijn werkt het beste als u het gebruikt voor u gaat slapen. Ga vooraf naar het toilet. **Lees de instructies** op Apotheek.nl. Scan de QR-code hiernaast om de uitleg te lezen.



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- Buikpijn en misselijk zijn.  
Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan in bij de maaltijd.
- winderigheid
- minder eetlust

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Blijf uit de felle zon en ga niet onder de zonnebank. Dit medicijn maakt uw huid gevoeliger voor UV-licht. Daardoor kunt u eerder verbranden door de zon.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

**Let op!** Krijgt uw baby diarree? Geef dan geen borstvoeding en overleg met uw arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

