

Samenvatting van **methadon**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Methadon is een sterke pijnstiller.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- matige of hevige pijn
- bij verslaving aan opiaten, zoals heroïne, of morfine-achtige pijnstillers. U krijgt dan een ontwenningsskuur

Tabletten en drank met methadon werken binnen een half uur tot 2 uur. Daarna blijft methadon ongeveer 10 uur tegen de pijn werken.

Injecties met methadon werken binnen 20 minuten en blijven 4 tot 8 uur werken.

Als u methadon gebruikt als ontwenningsskuur, dan werkt een dosis 1 tot 2 dagen.

Gebruik

Methadon is er als tabletten, drank, infuus en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten en drank met methadon

Neem dit medicijn zoals uw arts u dit heeft uitgelegd.

Infuus en injecties met methadon

U krijgt het infuus en de injecties van uw arts of verpleegkundige.

Gebruikt u dit medicijn **tegen pijn**? Gebruik het dan zolang u het nodig heeft. Doe dit volgens een vast schema. Bijvoorbeeld om de 4 tot 8 uur.

Gebruikt u dit medicijn als **ontwenningsskuur**? Houd u dan aan het afbouwschema dat uw arts voor u heeft gemaakt.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- verstopping in de darmen. Dit kan ernstig zijn. U kunt dit voorkomen door elke dag een laxeremiddel te gebruiken.
- andere klachten van de maag en darmen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Heeft u methadon voor een lange tijd gebruikt? Dan is er kans dat u aan dit medicijn gewend of verslaafd raakt. Stop niet in één keer met dit medicijn. Als u stopt, kunt u ontwenningssverschijnselen krijgen, zoals hartkloppingen, rillingen, onrust en misselijk voelen. Als u stap voor stap afbouwt, heeft u hier veel minder kans op. Bespreek dit met uw apotheker of uw arts.



Let op! U kunt suf en duizelig worden door dit medicijn. U mag daarom de **eerste 2 weken** niet autorijden als u met dit medicijn begint of als uw dosering omhoog gaat. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen.

Gebruikt u dit medicijn bij **verslaving aan opiaten**? Dan mag u de **eerste 3 maanden** of als de dosering omhoog gaat niet autorijden.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u extra suf maken.



Let op! u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik dit medicijn in ieder geval **NIET vlak voor de bevalling**.



Let op! Geeft u borstvoeding? U mag dit medicijn voor een paar dagen gebruiken. Gebruikt u dit medicijn voor een langere tijd? Vraag dan aan uw apotheker of arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan bijwerkingen geven bij de baby.