

Samenvatting van minipil met desogestrel

Waarom gebruikt u dit medicijn?

De minipil met desogestrel is een anticonceptiepil.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om zwangerschap te voorkomen.

Gebruik

De minipil met desogestrel is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Gebruikt u de minipil voor het eerst? Begin dan op de eerste dag dat u ongesteld wordt. Dan werkt de pil meteen en bent u meteen beschermd tegen zwangerschap.
- Begint u niet op de eerste dag, maar een paar dagen later? De pil is dan pas na 7 dagen betrouwbaar. Gebruik daarom in de eerste week extra vorm van anticonceptie, bijvoorbeeld condooms.
- Gebruikte u eerst een andere anticonceptiepil of -methode? Meestal kunt u direct overstappen op deze pil. Vraag uw apotheek om uitleg.
- Neem altijd op dezelfde tijd van de dag in. Dus altijd 's avonds of altijd 's ochtends. U slikt deze pil aan een stuk door, dus zonder pauzedagen. U neemt het dus ook in tijdens uw menstruatie.
- **Let op!** Bent u een pil vergeten of heeft u binnen 4 uur na het slikken overgegeven of heeft u ernstige diarree? Misschien werkt de pil dan niet meer goed. Kijk in de bijsluiter wat u moet doen. Of vraag dit aan uw apotheek.

Uitleg van de apotheeker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- tussentijds bloedverlies
- wegblijven van de menstruatie
- zwaarder worden
- misselijk worden
- pijnlijke borsten
- hoofdpijn.

Meestal gaan deze bijwerkingen binnen 3 maanden vanzelf weg.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen of blijft u last houden? Overleg dan met uw apotheeker of arts.

Waarschuwingen



De minipil met desogestrel en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Overleg met uw apotheeker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Bent u ondanks de minipil met desogestrel toch zwanger geworden? Stop dan met de minipil. Heeft u per ongeluk de eerste maanden van de zwangerschap de minipil gebruikt? Dit is niet slecht voor uw baby. Overleg hierover verder met uw apotheeker of arts.



Let op! Geeft u borstvoeding? Vanaf 3 weken na de bevalling kunt u de pil veilig gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. **Tot 3 weken na de bevalling** kunt u de pil beter **NIET** gebruiken.