

# Samenvatting van morfine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Morfine is een **sterke pijnstiller**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- ernstige pijn. Zoals na een operatie, ongeluk of hartaanval. Ook bij koliekl pijn en kanker.
- erg benauwd zijn
- pijn bij mensen die niet meer beter worden tijdens hun laatste levensfase

Het werkt binnen 1 tot 2 uur.

Tabletten met vertraagde afgifte werken 12 uur lang.

## Gebruik

Morfine is er als tabletten, drank en zetpillen.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruik morfine zolang u het nodig heeft en volgens een **vast schema**. U krijgt het schema van uw arts of apotheker.

### Tabletten met morfine

Slik de tabletten met een half glas water.

**Let op!** Gebruikt u de tabletten met vertraagde afgifte? Hier komt morfine langzaam uit vrij. De tabletten **niet fijnmaken of kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

### Drank met morfine

Meet de drank af. Doe dit met het maatbekertje, de doseerpipet of de druppelflacon.

### Zetpillen met morfine

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- erge verstopping. Gebruik daarom elke dag een laxermiddel.
- suf, moe en duizelig gevoel
- maagklachten en darmklachten. Zoals misselijk zijn, overgeven, buikpijn en minder eetlust.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Als u morfine lang gebruikt, kunt u verslaafd raken. Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk.

Heeft u morfine lang gebruikt en wilt u stoppen? **Stop niet in één keer**. Anders kunt u last krijgen van klachten. Vraag uw apotheker of arts om advies.



**Let op!** U mag **niet** altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Dit komt doordat u suf en duizelig kan worden. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker en arts.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u extra suf of slaperig maken.




**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik dit medicijn **niet** vlak voor de bevalling.



**Let op!** Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



1-5-2024