

Samenvatting van pancreasenzymen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Pancreasenzymen zijn nodig om het voedsel te verteren. Ze worden gemaakt door de alvleesklier.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- Alvleesklierziekten, als uw alvleesklier onvoldoende enzymen maakt
- Als de enzymen niet goed in uw darm kunnen komen, bijvoorbeeld bij alvleesklierontsteking of cystische fibrose (taaislijmziekte)

U moet dit medicijn gebruiken zolang uw alvleesklier onvoldoende enzymen maakt of zolang de enzymen niet goed in uw darm komen.

Gebruik

Pancreasenzymen is er als capsules en korrels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem het medicijn in tijdens het eten en met tussendoortjes.

Capsules met pancreasenzymen

- Heel doorslikken met een glas water of vruchtensap. NIET kauwen.
- Heeft u moeite met slikken? U mag de capsules openmaken en de inhoud op een lepel water, vruchtensap of appelmoes strooien. NIET kauwen.
- Strooi de inhoud NIET in melk, thee of op ijs.
- Drink een glas water of sap erna.

Korrels met pancreasenzymen

- Strooi de korrels op een lepel water, vruchtensap of appelmoes en slik door. NIET kauwen.
- Strooi de korrels NIET op melk, thee, wortelpuree of aardappelpuree.
- Drink een glas water of vruchtensap erna.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- buikpijn, verstopping of diarree
- misselijk worden
- een geïrriteerde huid rond uw anus. De huid rond uw anus kan irriteren door de enzymen in uw ontlasting. Als u de huid rond het poepgat insmeert met vaseline, heeft u er minder last van.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

