

# Samenvatting van podofyllotoxine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Podofyllotoxine remt de groei van cellen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij wratten aan de geslachtsdelen (genitale wratten).

De **aanstipvloeistof** niet langer dan 5 weken achter elkaar gebruiken. De **crème** niet langer dan 4 weken achter elkaar gebruiken.

Het **collodium** wordt meestal niet langer dan 3 tot 6 weken gebruikt.

## Gebruik

Podofyllotoxine is er als aanstipvloeistof, crème en collodium. Collodium is een sterke aanstipvloeistof. Deze mag alleen uw arts aanbrengen.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

De aanstipvloeistof of crème moet u meestal iedere week 3 dagen achter elkaar aanbrengen. Daarna volgt een pauze van 4 dagen.

**Let op!** Laat het medicijn NIET in het oog of op de oogleden komen. Dit is zeer irriterend voor de ogen. Laat het ook niet in de mond, neus of in een wondje komen. Gebeurt dit toch? Spoel dan direct met veel water.

**Let op!** De aanstipvloeistof en de collodium zijn brandbaar. Gebruik deze niet in de buurt van vuur (sigaretten, geiser).

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van Jeuk, branderig gevoel of irritatie op of rond de wratten. Dit verdwijnt meestal enkele minuten na aanbrengen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

