

Samenvatting van topiramaat

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Topiramaat kalmeert overprikkelde zenuwen in de hersenen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij epilepsie
- om migraine te voorkomen

Epilepsie: binnen een paar weken worden de aanvallen minder erg of verdwijnen.

Migraine: overleg met uw arts als u zich niet beter voelt na 2 tot 3 maanden.

Gebruik

Topiramaat is er als tabletten en capsules. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken..

Tabletten met topiramaat

Slik de tabletten met een half glas water. Niet kauwen.

Capsules met topiramaat

Slik de capsules met een half glas water. Niet kauwen. Heeft u moeite met slikken? U mag de capsules openmaken en de korrels op een lepel zacht voedsel strooien. Slik de korrels zonder te kauwen.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- slaperig, zwak, suf of duizelig voelen
- wazig zien
- dingen vergeten
- moeite hebben met concentreren
- keelpijn, loopneus of verstopte neus
- minder trek in eten
- misselijk zijn en diarree
- doof of tintelend gevoel in armen of benen

U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Topiramaat en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met topiramaat.



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U mag **1 week niet autorijden** als u start met dit medicijn of als uw dosering omhoog gaat. Rijd daarna alleen auto als u geen last heeft van bijwerkingen.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? U mag dit medicijn meestal niet gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.