

# Samenvatting van acenocoumarol

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Acenocoumarol is een antistollingsmedicijn. Het zorgt dat uw bloed minder snel een klont vormt. Daardoor heeft u minder kans op trombose (bloedpropje).

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij trombose
- bij hartritmestoornissen
- na een hartaanval
- na een beroerte (herseneninfarct of TIA). Bij een beroerte zit er een bloedpropje vast in de hersenen.
- Of om dit alles te voorkomen.

De **trombosedienst** controleert uw bloed zolang u dit medicijn gebruikt

## Gebruik

Acenocoumarol is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met water.

Neem dit medicijn **elke dag** tussen 16.00 en 18.00 uur.

Zegt de trombosedienst dat u **minder of meer** acenocoumarol moet innemen? Dan kunt u dat dezelfde dag nog doen.

## Wordt u geopereerd?

Vraag dan aan de trombosedienst of u moet stoppen met dit medicijn.

## Bijwerkingen

U kunt sneller last krijgen van:

- blauwe plekken
- een bloeding in uw lichaam.

Bel **meteen** uw arts als u last krijgt van:

- grote blauwe plekken
- bloed in uw poep of plas
- ineens zware hoofdpijn

## Waarschuwingen



**Let op!** Acenocoumarol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van bijvoorbeeld de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken samen met acenocoumarol.

**Let op!** Veel dingen hebben invloed op hoe goed uw bloed stolt. Zoals eten. De **trombosedienst** kan u advies geven. Het is belangrijk dat u hun adviezen opvolgt.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Door alcohol kan het langer duren voordat een wondje stopt met bloeden. Drink daarom liever geen alcohol. Of drink minder dan 2 glazen per dag.



**Let op!** U mag dit medicijn **niet** gebruiken als u zwanger bent. U mag dit medicijn ook **niet** gebruiken als u zwanger wilt worden. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



U mag borstvoeding geven als u dit medicijn gebruikt.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

