

Samenvatting van **tadalafil**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tadalafil maakt sommige bloedvaten wijder. Hierdoor kan uw bloed er beter doorheen stromen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- moeite om een stijve penis te krijgen (erectieproblemen)
- hoge bloeddruk in uw longen
- problemen met plassen door een te grote prostaat

Bij erectieproblemen

Na een half uur tot 1 uur wordt uw penis stijf door seksuele prikkeling. Het werkt een paar uur.

Bij hoge bloeddruk in de longen

Na ongeveer 12 weken wordt u minder benauwd.

Bij problemen met plassen door een te grote prostaat

U merkt na 1 tot 2 weken of het goed genoeg werkt.

Gebruik

Tadalafil is er als tabletten. Op het etiket van uw apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- buikpijn
- misselijk zijn
- opvliegers
- spierpijn
- een verstopte neus
- duizelig worden
- wazig zien of minder goed horen. Bel uw arts als u opeens minder goed ziet of hoort.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Gebruik tadalafil **niet meer dan 1 keer per dag**. Anders krijgt u te veel bijwerkingen.

Waarschuwingen

Let op! Mensen met een hart- of vaatziekte kunnen weer klachten krijgen. Ook mensen die een hartaanval of beroerte hadden, kunnen klachten krijgen. Krijgt u **pijn op de borst**? Bel dan meteen een arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Alcohol kan het moeilijker maken om een erectie te krijgen.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw apotheker of arts of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Overleg met uw apotheker of arts of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

