

Samenvatting van diclofenac

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Diclofenac werkt bij:

- pijn, zoals van de schouder of gewrichten
- ontsteking van gewrichten (zoals reuma en jicht)
- menstruatieklachten
- griep en koorts
- migraine en hoofdpijn

Pijn wordt vaak minder na 1 tot 2 uur.

De rode huid en zwelling door de ontsteking worden na ongeveer 1 week minder.

Gebruik

Diclofenac is er als tabletten en zetabletten.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiters staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met diclofenac

Slik de tabletten met een half glas water. U kunt de tabletten het beste op een lege maag slikken.

Let op! Er zijn gewone tabletten en tabletten met een speciaal laagje. Op die tabletten staat *maagsapersistent, retard, MGA* of *MVA*. Deze tabletten mag u **niet** fijnmaken of kauwen. Anders kunt u maagklachten krijgen of werken de tabletten te kort.

Gewone tabletten en maagsapersistente tabletten werken 6 uur. Langwerkende tabletten (retard, MGA, MVA) werken 12-24 uur.

Zetabletten met diclofenac

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat). De zetpil werkt na ongeveer 30 minuten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van klachten van de maag. Zoals buikpijn, misselijk zijn, overgeven, brandend maagzuur, diarree, verstopping, winderigheid of boeren.

Gebruikt u tabletten en heeft u last van deze bijwerkingen? Neem ze dan samen met eten. Dan heeft uw maag er minder last van.

Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
- Heeft u **eerder** maagzweren of darmzweren gehad?

Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen



Let op! Diclofenac en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken samen met diclofenac.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op met alcohol. Alcohol geeft meer kans op maagklachten.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw apotheker of arts of u diclofenac mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag diclofenac in ieder geval **NIET** gebruiken bij pijn in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

