

Samenvatting van **ibuprofen**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ibuprofen werkt bij:

- Pijn en ontsteking van gewrichten. Zoals: jicht, reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew
- Pijn door artrose (dunner kraakbeen in uw gewricht)
- Hoofdpijn en migraine
- Menstruatieklachten
- Spierpijn
- Griep en verkoudheid

Ibuprofen werkt na 30 tot 60 minuten. Het werkt 8 uur lang. Vertraagde-afgiftetabletten en zetpillen werken na 2-3 uur. Ze werken ongeveer 12 uur lang.

Gebruik

Ibuprofen is er als tabletten, capsules, dragees, poeder voor een oplossing, als drank en als zetpillen.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn **niet vaker dan 4 keer** per dag.

Tabletten, capsules en dragees met ibuprofen

Tabletten, capsules of dragees: slikken met een half glas water. Niet kauwen.

Smelttabletten: in de mond laten smelten en slikken met een half glas water.

Kauwcapsules: kauw de capsules goed fijn en slik door.

Poeder met ibuprofen

1. Doe het in een half glas water.
2. Wacht tot het bruisen is gestopt.
3. Drink het glas leeg.
4. Spoel het glas na met wat water en drink dat ook op.

Drank met ibuprofen

1. Schud het flesje goed.
2. De goede hoeveelheid afmeten met een maatbeker of maatlepel.
3. Drink die hoeveelheid op.

Zetpillen met ibuprofen

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat), met de punt naar voren.

Hoelang?

Gebruikt u dit medicijn tegen koorts? Neem het dan niet langer dan 3 dagen.

Gebruikt u het tegen pijn? Neem het dan niet langer dan 5 dagen.

Blijft u klachten houden? Overleg dan met uw arts.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maag- en darmklachten. Zoals misselijk zijn, buikpijn, brandend maagzuur en verstopping.
- Vooral als u het lang gebruikt

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
- Heeft u **eerder** maagzweren of darmzweren gehad?

Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen



Let op! Ibuprofen en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met ibuprofen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Door alcohol te drinken krijgt u meer kans op klachten van de maag.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

U mag dit medicijn **niet** gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

