

# Samenvatting van prednisolon

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Prednisolon remt ontstekingen en overgevoelighedsreacties.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- ontstekingen  
Zoals van uw longen (bij astma of COPD), gewrichten, huid of darmen.
- clusterhoofdpijn
- bloedziektes
- verlamming van het gezicht
- nierziekten
- orgaantransplantaties
- kanker
- misselijk gevoel door chemotherapie
- bijnierziekten om uw eigen bijnierschorshormoon aan te vullen

Binnen een paar uur worden uw klachten minder.

## Gebruik

Prednisolon is er als tabletten, capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten en capsules met prednisolon

Slik de tabletten of capsules met een half glas water. Niet kauwen.

### Drank met prednisolon

1. Schud het flesje goed.
2. De goede hoeveelheid afmeten met een maatbeker of maatpipet.
3. Drink die hoeveelheid op.

Prednisolon wordt ook gebruikt als **stootkuur**. Dit is een kuur die een paar dagen tot weken duurt.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten van de maag en darmen. Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan met wat eten.
- hoofdpijn
- spierpijn
- heftige emoties. Zoals bang zijn of depressie.
- vocht in uw benen of handen
- infecties

Gebruikt u prednisolon langer dan een paar weken?

Of krijgt u vaker per jaar een stootkuur?

U kunt zwaarder worden, een bol gezicht krijgen en last krijgen van botontkalking. Ook kunt u huidklachten krijgen zoals blauwe plekken

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Prednisolon en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met prednisolon.



**Let op!** Gebruikt u dit medicijn langer dan 3 weken en wilt u stoppen? Stop dan niet in één keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: hoofdpijn, trillen, hartkloppingen en misselijk gevoel. Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? En gaat u dit medicijn **langer dan een paar weken** gebruiken? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.