

Samenvatting van Triamcinolonacetonide op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Triamcinolonacetonide is een corticosteroid. Dat is een hormoon uit de bijnierschors. Het remt ontstekingen en maakt schilfers, jeuk en zwellingen minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidziektes met ontstekingen:

- eczeem
- jeuk
- psoriasis
- lichtovergevoeligheid

De jeuk wordt na een paar uur minder.

De schilfers en rode huid worden na een paar dagen minder.

Gebruik

Triamcinolonacetonide op de huid is er als smeersel, zalf of crème. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.


Smeer dit medicijn **op de plekken waar u last van heeft**. Uw arts of apotheker legt u uit hoe u dit medicijn moet smeren. Gebruik het **topje van uw vinger** om te kijken hoeveel u moet smeren.

Smeer niet te dik of te dun. Anders krijgt u bijwerkingen of werkt dit medicijn niet genoeg.

Bekijk op Apotheek.nl het plaatje met uitleg over hoeveel u moet smeren. Scan de QR-code hiernaast om het plaatje te zien.



Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een dunnere huid. Krijgt u last van wondjes of blauwe plekken? Stop dan met dit medicijn en bel uw arts.

Heeft u last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Bel uw arts **meteen** als u last krijgt van een **infectie op uw huid**. Gebruik dit medicijn dan **niet** op een plek met een infectie. Door dit medicijn merkt u minder snel een infectie van uw huid. De infectie kan dan groter worden.

Waarschuwingen



Let op! Smeert u ook andere dingen op uw huid? Zoals crèmes en andere medicijnen? Smeer dan eerst triamcinolonacetonide op de huid. **Wacht daarna 1 uur**. Dan is dit medicijn goed ingetrokken. Smeer daarna uw andere medicijn of crème.



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.



Wilt u borstvoeding geven? En gebruikt u dit medicijn op uw tepels? **Let op!** Was dit medicijn vóór de voeding weer van uw tepel af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond.