

Samenvatting van bumetanide

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Bumetanide is een plastablet. Het zorgt dat u onnodig vocht uitplast. Hierdoor kan uw hart beter pompen. En het beschermt uw nieren.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hartfalen (uw hart pompt het bloed minder goed rond)
- oedeem (uw lichaam houdt te veel vocht vast)
- nierziekten

U moet door dit medicijn meer plassen. Meestal een half uur tot ongeveer 6 uur nadat u dit medicijn heeft ingenomen. Binnen een paar dagen bent u minder benauwd en heeft u minder dikke enkels.

Gebruik

Bumetanide is er als tabletten. Dit medicijn is er ook als injectie. Deze tekst gaat alleen over de tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Slik dit medicijn elke dag. Dan blijft uw hart het bloed beter rondpompen. U bent dan minder snel moe en benauwd.

Moet u veel plassen op onhandige momenten? Dan kunt u dit medicijn op een ander moment slikken. Neem het **niet later dan 18.00 uur**. Anders moet u in de nacht vaak opstaan om te plassen

Bijwerkingen

U kunt de eerste dagen hoofdpijn krijgen of duizelig worden. Bent u duizelig? Sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! bumetanide en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met bumetanide.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

