

# Samenvatting van clindamycine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clindamycine is een antibioticum.

Het werkt tegen infecties met bacteriën en parasieten (heel kleine beestjes).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties met bacteriën van:

- de longen of luchtpijp
- de bijholten (de holten in uw wangen, links en rechts naast uw neus)
- de huid
- de vagina

Clindamycine werkt ook bij infecties door parasieten, zoals:

- toxoplasmose
- malaria

U heeft na een paar dagen minder last van de klachten.

## Gebruik

Clindamycine is er als drank en capsules.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Drank met clindamycine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of maatlepel.
3. Drink die hoeveelheid op.

### Capsules met clindamycine

Slik de capsules met een heel glas water.

Dan irriteren de capsules niet uw mond of slokdarm.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- diarree
- buikpijn

Deze bijwerkingen gaan over als u dit medicijn langer gebruikt of nadat de kuur klaar is.

**Let op!** Bel uw arts **meteen** als u last krijgt van:

- ernstige diarree met kramp in de buik
- meer keren per dag diarree met overgeven en koorts
- allergie.

Dit merkt u aan blaren op uw huid, benauwdheid, een opgezwollen gezicht en flauwvallen. Stop dan met dit medicijn.

**Let op!** Bent u allergisch voor clindamycine? Meld dit dan bij uw apotheek.

## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Oók als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën of parasieten.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

