

Samenvatting van codeïne

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Codeïne werkt tegen hoest. Het is ook een pijnstiller.

Uw arts schrijft het voor bij:

- kriebelhoest
- diarree
- pijn

Codeïne werkt binnen een half uur.
Het werkt 3 tot 4 uur lang.

Gebruik

Codeïne is er als tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met codeïne

Slik de tabletten met een half glas water.

Drank met codeïne

Meet de drank af met het maatbekertje.

Let op! Wacht **6 uur** voordat u weer codeïne neemt.
Gebruik dit medicijn **niet vaker dan 4 keer per dag**.

Hoelang?

Bij hoest of diarree:

Gebruik dit medicijn totdat uw klachten weg zijn.
Dit is meestal binnen een paar dagen.

Bij kriebelhoest:

Heeft u na 2 weken nog steeds kriebelhoest?
Vraag dan uw arts wat u moet doen.

Bij pijn:

Gebruik het zo kort mogelijk.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- verstopping
- suf en slaperig voelen
- duizelig zijn

Heeft u last van verstopping? Eet vezelrijke voeding en drink veel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Wordt u suf, slaperig of duizelig van dit medicijn? Rijd dan géén auto.

Gebruikt u meer dan **20 milligram codeïne per keer**? Of gebruikt u codeïne **vaker dan 3 keer per dag**? Dan mag u de **eerste 2 weken NIET autorijden**. Rijd daarna alleen als u niet suf, slaperig of duizelig bent.



Let op met alcohol als u codeïne gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u codeïne mag gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan bijwerkingen geven bij de baby.



Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

