

# Samenvatting van **denosumab**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Denosumab remt de afbraak van botten.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij botontkalking (osteoporose)
- als uw botten door de behandeling van kanker eerder kunnen breken
- als uw botten door uitzaaiingen van kanker pijnlijk en broos worden

U heeft minder kans op botbreuken als u denosumab gebruikt.

## Gebruik

Denosumab is er als injecties. Er zijn twee soorten injecties met denosumab.

Op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Prolia-injectie met denosumab

De Prolia-injectie kunt u eventueel zelf toedienen. Uw arts of verpleegkundige legt uit hoe dat moet. De beste plaats voor de injectie is de bovenkant van uw dijen of uw buik. Dat doet u dan een keer in de 6 maanden.

### Xgeva-injectie met denosumab

De Xgeva-injectie wordt door uw arts of verpleegkundige gegeven. U krijgt de injectie een keer in de 4 weken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- spierpijn
- pijn in uw gewrichten, vooral van armen of benen
- infecties, zoals blaasontsteking of bronchitis
- haaruitval
- huiduitslag

Gebruikt u de Xgeva-injectie? Deze zijn sterker. Door deze injectie kunt u ook last krijgen van:

- snel buiten adem zijn
- diarree

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik. **Pas 5 maanden** nadat u gestopt bent met denosumab mag u weer zwanger worden.



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

